



BMRG Véradás – 02.24. péntek 13-18h

Fontos tudnivalók

Ami miatt számítunk Rád:

- ✘ **1 véradás = 3 beteg emberen való segítség**, hiszen a teljes vérből háromféle készítményt állítanak elő

Ami feltétlenül kell hozzá:

- ✘ egészségesnek kell lenni
- ✘ minimum: 50 kg testsúly
- ✘ **személyi igazolvány** (vagy jogosítvány, vagy útlevel) **TAJ kártya (első véradó lehetőleg eredeti TAJ kártyával jelentkezzen**, aki adott már vért, másolatot is hozhat, EU-s kék pasztik kártya megfelel, a TAJ számot bemondásra nem fogadják el!!!) **lakcímkártya kötelező**
- ✘ előtte étkezni kell, és sok folyadékot fogyasztani – a levett vérmennyiség 450 ml, ez testünk számára tartalék, fontos, hogy a folyadékfogyasztás bőséges legyen, így nem lesz probléma

Kik és milyen gyakran adhatnak vért?

- ✘ 18-60 éves korig, rendszeres véradóknál maximum 65 éves korig engedélyezett
- ✘ férfiak évente 4-5 alkalommal, hölgyek maximum 3 alkalommal
- ✘ a véradóknak az elmúlt 365 napot kell figyelembe venniük, ha ezen belül, férfiak esetén öt, nők esetén három alkalom már volt, akkor sajnos meg kell várni, amíg letelik az első alkalomtól számított egy év
- ✘ két véradás között minimum 8 hét szünetet kell tartani
- ✘ a vérszegénységet minden esetben a helyszínen ellenőrzik (fájdalommentes ujjbegyszúrás)
- ✘ kezelt vérnyomásbetegséggel, ha a pillanatnyi érték jó, szabad vért adni, az orvos mindig megméri

Milyen esetekben nem lehet?

- ✘ foghúzás és gyökerkezelés, antibiotikum után 4 hét szünet tartandó
- ✘ pajzsmirigy-működési zavar esetén hormonpótló gyógyszer szedése mellett tilos (Euthyrox, L-thyroxin stb.)
- ✘ cukorbetegség esetén tilos (inzulinos)
- ✘ terhesség kizáró ok, szülés után egy évig, szoptatás befejezése után min. fél évig nem lehet vért adni
- ✘ herpes fertőzés után 4 hétig tilos
- ✘ gyógyszereszedés önmagában nem kizáró ok (kivétel: antibiotikum, szteroidok), a kivizsgáló orvos a helyszínen dönt erről
- ✘ tetoválás, piercing, akupunktúra után fél év várakozás szükséges
- ✘ allergia elleni gyógyszereszedés alatt tilos!
- ✘ kullancscsípés után 6-8 hét várakozás szükséges, mert a tünetek eddig jelentkezhetnek, Lyme-kór (igazolt) esetén végleges véradási eltiltás (jelen állapot szerint)
- ✘ maláriaveszélyes területen tartózkodás után (ha nem szedett gyógyszert) min. fél év szünet, malária elleni gyógyszer szedése után orvosi konzultáció, de min. 3 év várakozás

Amiben biztos lehetsz:

- ✘ fertőzésveszély kizárt, egyszer használatos eszközökkel dolgoznak
- ✘ az adatokat az adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli az országos Vérellátó Szolgálat